

**ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА  
КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ  
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

**ТЕМА:**

**Transtorakalna i transoesophagealna  
exocardiografija**

**Dr. BAJRAM ALIU  
Spec.intern.kardiolog**

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

## I. Акутен миокарден инфаркт

При трансторакална ехокардиграфија се визуелизираат рани и касни компликации на АМИ.с

## A. Акутни компликации



Лева вентрикуларна дисфункција

При коронарна артериска оклузија зидните движења се пореметени, со акиретички сегменти.



Десна вентрикуларна дисфункција

Овде го зафаќа инфериорниот миокарден инфаркт и е зафатена десната коронарната артерија.

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

■ Руптура на миокардот:

- ❖ Руптура на зидот на вентрикулот
- ❖ Руптура на септумот на вентрикулот
- ❖ Руптура на папиларниот мускул-акутна митрална инсуфициенција

■ Мурален тромбс

■ Перикардит

## Б. Касни компликации-хронични

■ Ремоделирање на левиот вентрикул

Неколку недели после инфарктот се случува левавентрикуларна дилатација, систолна-диастолна дисфункција со истенчување на поедини сегменти акинетички, дискинетички и аневризматични промени

■ Хронична митрална инсуфициенција

После АМИ се јавува ХМИ во склоп на вентрикуларното ремоделирање.

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

## II. Кардиомиопатии

### ■ Хипертрофична кардиомиопатија

Се визуелизираат дебелината на левиот вентрикул, кој може да биде опструктивна хипертрофична и неопструктивна.

### ■ Дилатативна кардиомиопатија

Ова болест се јавува кај повеќе срцеви заболувања и се карактеризира со лева вентрикуларна дилатацијам, глобална хипокинезија со истенчување на зидовите на левиот вентрикул.

### ■ Рестриктивна кардиомиопатија

Се карактеризира со изразита диастолна дисфункција и се јавува кај амилоидозна, фиброза, хемакроматоза, саркоидоза за срцето.

Ехокардиографски се визуелизира бивентрикуларна хипертрофија, биатриална, дилатација на миокардот.

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

■ Мурален тромб

■ Перикардит

Б. Касни компликации-хронични

■ Ремоделирање на левиот вентрикул

Неколку недели после инфарктот се случува левавентрикуларна дилатација, систолна-диастолна дисфункција со истенчување на поедини сегменти акинетички, дискинетички и аневризматични промени

■ Хронична митрална инсуфициенција

После АМИ се јавува ХМИ во склоп на вентрикуларното ремоделирање.

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

■ Мурален тромб

■ Перикардит

## Б. Касни компликации-хронични

■ Ремоделирање на левиот вентрикул

Неколку недели после инфарктот се случува левавентрикуларна дилатација, систолна-диастолна дисфункција со истенчување на поедини сегменти акинетички, дискинетички и аневризматични промени

■ Хронична митрална инсуфициенција

После АМИ се јавува ХМИ во склоп на вентрикуларното ремоделирање.

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

## Ц. Аортни валвули

Ехокардиографски аортните валвули се прикажуваат во долга оска, кратка оска, апикално пет шуплински и супкостални приказ.

Трансторакална рутински апикално пет шуплински континуиран доплер и пулсен доплер се прикажуваат брзините на протокот на крвта.

### ■ Стеноза на аорталната валвula

Се карактеризира со стеснување на аорталните валвули и со опструкција на протокот на крвта.

Најчеста причина на аорталното стеснување се:

- конгенитална бикуспидна аорта,
- реуматизмално заболување и
- дегенеративна калцификација.

Со доплер се применува три методи:

- Валвуларен градиент
- Валвуларно пресметување и
- Валвуларно мерење.

# ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА “ЧАПА” - ИСТАМБУЛ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

## ■ Аортална инсуфициенција

Ова појава се визуелизира со доплер во апикално пет шуплински, апикално три шуплински и во кратка оска.