

Dr. Ismail Sabani
Nevropsihijatrisko odd.
JZU. OB. "Ferid Murad"



ЕЛЕКТРО КОНВУЛЗИВНА ТЕРАПИЈА- ЕКТ

Метода/Историја



- Распространета биолошка метода за лекување во психијатријата, која предизвикува конвулзии во корист за лекување на психијатриски болни.
- Прв пат употребена во Италија во 1938 година.
- Со појавата на нови лекови од новата генерација употребата на ЕКТ се намалува.

Индикација:



- ЕКТ денеска се применува првенствено во лекувањето на:
- Депресивни-психотички состојби и кататона-ступорозна шизофренија.
- ЕКТ малку е ефикасен и кај шизоафективните психози.

Контра индикација:



- Апсолутна контраиндикација е кај експанзивни процеси во главата.
- Акутен Инфаркт на миокардот.
- Релативни контраиндикации влегува:
 - 1. Хипертензијата .
 - 2. Коронарна инсуфициенција.
 - 3. Анеуризма на аорта.
 - 4. Тромбофлебитични процеси.
 - 5. Заболување на коските.

ПРИПРЕМА НА болниот за ЕКТ:



- Кога се поставува индикација за ЕКТ детално треба да се испитуваат:
 1. Здравствената состојба на болниот.
 2. Радиолошки преглед на:
 - а. белите дробови.
 - б. срцето.
 - ц. лумбосакралната кичма.
 - д. ЕКГ,да се прегледа
 - г. Очното дно (евентуално папилла стагнанс), ЕЕГ, КТМ.

Текника за апликација на ЕКТ



- Апаратура која служи за апликација на ЕКТ е едноставно за ракување.
- Погодно за носење, се одредува јачината на струјата измеѓу 100 и 800 мА.
- Напонот се регулира измеѓу 70 и 130.
- Волнта неизменична електрична струја .
- Се смета дека потенцијал измеѓу 70 и 130 волта,јачина од 200 и 1600 мА во време од 0,1 до 0,5 секунди настанува конвулзии.
- ЕКТ обично се дава пред доручак на гладно (за време на конвулзии болниот може да аспирира храната).

Текника за апликација на ЕКТ (2)



- Да биде празен мочното бабуле. .
- Да отсрани протези ако има.
- Да не дојде повреда на јазикот се става специјална гума измеѓу забите.
- Главата се става во хиперекстензија.
- Електродите се сместуваат бitemporalno, прво местото се чисти со физиолошки раствор, се става специјално желе за да се намали отпорот на електричната струја и да не дојде повреда на кожата или опекотини.
- Со затварање на струјното коло, доаѓа до нагло губење на свеста на болниот, се појавува тонички а потоа клонички грчеви, што практично одговара на спонтано

Текника за апликација на ЕКТ (3)



- Епилептички напад од типот на ГРАНД мал., болниот не дише, настанува цијанотичен, потоа почнува респираторната функција, пациентот краткотрајно се буди и после влегува во длабок сон..
- Обично ЕКТ се дава 3 пати неделно се до подобрување на состојбата.
- Депресивните болни после четвртата или петата апликација покажуваат знаци за подобрување.
- Третман обично содржи од 6 до 12 апликации.

Компликации од Електро Конвулзивна терапија:



Непосредни компликации:

- Се јавува после освестувањето на болниот:
- Најчесто—главоболка, поспаност, збуњеност, губење на апетит, пореметување на цревната функција

Компликации од Електро Конвулзивна терапија (2)



Психички компликации

- Најчесто се пореметува:
- Памтењето со ретроградна и антероградна амнезија.
- Се пореметува ориентацијата за време простор и према личности.

Компликации од Електро Конвулзивна терапија (3)



- Телесни компликации:

А) Смрт на болниот

- Најтешка компликација како последица од миокарден инфаркт, ретка појава 5 смртни случаеви на 100.000 третмана.

Компликации од Електро Конвулзивна терапија (4)



Б) Оштетување на структурата на ЦНС како пролазни а ретко и трајни.

- **1** : афазија,агнозија, губиток на тетивни и појава на патолошки рефлекси, се појавуваат автоматизми и неволни покрети, може да дојде и до серија на напади па и до статус епилептикус.
- **2**: продолжено мозочна хипоксија, кардиоваскуларни пореметување, тахикардија, аритмија и пад на крвниот притисок.
- **3**; Рetenција на урина, пореметено на дишење, зголемување на нивото на шекерот, на протеини, електролити, холестеролот, на мокрачна киселина, на линфоцитите.

Компликации од Електро Конвулзивна терапија (5)



Ц). Фрактури на коските поради јака мускулна контракција.

- Со добра припрема на пациентот, премедикација, примена на миорелаксантни средства и со добра соработка со анестезиологот значително се намалени компликациите од Електро Конвулзивната терапија.



Ви Благодарам