

Prezentacija od obukata obavena vo Bolnica Tokuda-Sofija, R. Bugarija za KST

Od Dr. Snezana Matovic spec. internist
Klinicka Bolnica

Od 16.06-10.07.2015

Ovoj test se primenuva za procena na koronarnите rezervи на srceto. За време на обуката се запознав со следните патолошки состојби кaj пoveke kariovaskularni заболувања.

1. Pacienti so hipertenzivna bolest-regulirana со медикamenti кaj koi testot bese negativen bez промени на EKG записот I без enormni pokacuvanja на krvniот притисок.
2. Pacient so AP-stentiran кaj kogo исто testot bese negativen sto значи пациентот земал redovna kardioloska I antihipertenzivna terapija.
3. Pacient so AP I HTA-kaj kogo во текот на izveduvanjeto на KST se pojavi длабока депресија во site prekordijalni odvodi I testot bese prekinat во tretata минута I пациентот бese prepraten на коронарографија.

- 
4. Pacient so AP I HTA kaj kogo testot bese prekinat vo tretata minuta poradi enormno pokacuvanje na krvniot pritisok 240/140mmHg. I ovoj test se procenuva kako pozitiven.
 5. Pacient so AP kaj kogo testot bese prekinat vo cetvrta minuta poradi bolka vo gradite I promeni na EKG I prepraten vednas na koronarografija. Testot se procenuva kako pozitiven.

Ovie se pokarakteristicnite sluaci so pozitiven KST, ostanatite pacienti
bea so negativen KST sto znaci zdravstvenite problemi ne bea od
kardiovaskularno poteklo.

Kriteriumi za prekinuvanje на КСТ се:

- Pokacen krven pritisok над 240/120mmHg
- Pokacena frekvencija на srceto над 160/min
- Promeni во ЕКГ зapisot
- Gradna bolka
- ST elevacija
- Vrtoglavica

So pocit, Dr. Snezana Matovic spec. internist
Klinicka Bolnica-Tetovo