

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ
ЈЕРСИНИОЗА ВО ИНФЕКТОЛОГИЈА И РЕВМАТОЛОГИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање и третман на јерсиниоза во инфектологија и ревматологија.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и на третманот на јерсиниоза во инфектологија и ревматологија е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност за дијагностицирање и на третманот на јерсиниоза во инфектологија и ревматологија по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на на дијагностичкиот процес и на третманот, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 5243/2

7 ноември 2012 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ЈЕРСИНИОЗА

МЗД Упатство

6.8.2010

- Основни показатели
- Предизвикувач
- Симптоми и клиничка слика
- Дијагноза
- Лекување
- Индикации за специјалистичка консултација
- Поврзани извори

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

- За јерсиниоза се размислува кај пациентите со:
 - Акутна абдоминална болка
 - Акутен пролив
 - Фебрилна состојба од непознато потекло
 - Reiter–ова болест:
 - arthritis,
 - urethritis,
 - iritis, conjunctivitis
 - Erythema nodosum
 - Абнормални резултати од: урината, црнодробните тестови или тестовите за pancreatitis
 - зголемена седиментација.

ПРИЧИНТЕЛИ

- Yersinia enterocolitica 3 и 9, Y. pseudotuberculosis IA и 3.
- Причинителот не може да се идентифукува врз основа на клиничките симптоми.

СИМПТОМИ И КЛИНИЧКА СЛИКА

Симптоми на акутната инфекција

- Покачена температура
- Пролив: децата често имаат крв и слуз во столиците.
- Болка во стомакот: кај децата е почесто во десниот долен квадрант. Ако пациентот биде опериран се детектираат: мезентеријална лимфаденопатија, терминален илеитис или вистински апендицитис.

Постинфективни симптоми

- Реактивен артритис
 - 1 до 3 недели по ентеритисот
 - Симптомите варираат од умерена артралгија до тежок полиартритис, понекогаш со Reiter-ов синдром.

- Мал процент од пациентите развиваат хроничен артритис.
- Болеста е во строга корелација со HLA-B27.
- Очни симптоми
 - Иритис
 - Конјунктивитис
- Уринарни симптоми
 - Уретритис
 - Баланитис
 - Гломерулонефритис
- Кожни симптоми
 - Erythema nodosum е најчестата кожна манифестација (кај околу 10% од случаите предизвикани од Yersinia); ова може да биде и единствен симптом на јерсиниозата.
- Кардиолошки наоди
 - Минливи ЕКГ абнормалности
 - Промени на залистоците не се сретнуваат при јерсиниозата.
- Други симптоми
 - Хепатитис, панкреатитис или тироидитис

ДИЈАГНОЗА

Копрокултура

- Во акутната фаза е од корист.
- Сензитивноста се смалува брзо по повлекувањето на симптомите на ентеритисот.

Серологија

- Примарен дијагностички метод при постинфективните симптоми (артритис)
- Најспецифична е ELISA методата.
 - Неодамнешната инфекција може да се дијагностицира врз основа на еден примерок серум.
 - Класата IgM антитела се јавуваат по неколку дена, а исчезнуваат по неколку месеци.
 - Класата IgG антитела може да се детектираат со години.
 - Класата IgA антитела се делумно во врска со артритисот.
 - Вкрстена реакција се појавува помеѓу *S. enterocolitica* 9 и *Brucella*, но ELISA инхибиторниот тест кој ја потврдува дијагнозата задолжително се прави при позитивните случаи.

ЛЕКУВАЊЕ

- Болеста вообичаено поминува спонтано.
- Хронични носители не се откриваат.
- Има малку докази за ефектите од антибиотскиот третман; ефектите од антибиотскиот третман врз појавата на постинфективните симптоми се непознати.

ИНДИКАЦИИ ЗА АНТИБИОТИЦИ

- Септикемија
- Фулминантна болест или тешки постинфективни симптоми (на пример, артрит) се релативни индикации за антибиотска терапија.

ИЗБОР НА АНТИБИОТИЦИ И ДОЗИРАЊЕ

- Кинолони, н.пр. ciprofloxacin 500 mg x 2 x 7 до 10 дена
- тетрациклините се добра алтернатива
- TMP-SMX е лек на избор кај децата

ИНДИКАЦИИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА КОНСУЛТАЦИЈА

- Акутен апендицитис
- Тешки постинфективни симптоми

ПОВРЗАНИ ИЗВОРИ

31.12.2008

Други интернет извори

1. Cash B, Johnston M, Martin G. Yersinia Enterocolitica. eMedicine

Автор: Rauli Leino

Article ID: ebm00035 (001.020)

© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 6.8.2010, [www. ebm-guidelines.com](http://www.ebm-guidelines.com)**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање до август 2014 година.**