

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство донесе

**УПАТСТВО  
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ  
ПРИ ИКТЕРИЧЕН ПАЦИЕНТ**

**Член 1**

Со ова упатство се утврдува медицинско згрижување преку практикување на медицина заснована на докази кај иктеричен пациент.

**Член 2**

Начинот на третман на иктеричен пациент е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

**Член 3**

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинско згрижување на иктеричен пациент, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во одделни случаи по оценка на докторот, може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено обrazложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

**Член 4**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.

Бр. 07-10083/1

17 октомври 2014 година

Скопје

**МИНИСТЕР**

**Никола Тодоров**

## ИКТЕРИЧЕН ПАЦИЕНТ

### МЗД упатство

17.05.2013 • Последна промена 21.2.2011

Pekka Pikkarainen и Ritva Koskela

- Основни правила
- Дефиниција
- Патофизиолошка класификација на иктеричниот синдром
- Историја на пациентот
- Наоди
- Горноабдоминална сонографија на абдомен
- Лабораториски испитувања
- Други испитувања
- Поврзани извори

### ОСНОВНИ ПРАВИЛА

- Треба промптно да се идентифицираат пациенти со опструктивен иктерус кои може да се лекуваат хирушки или ендоскопски. Кај пациенти со акутен иктерус, потребно е да се направи горноабдоминална ултрасонографија, пожелно во првите 24 часа од појавата.
- Испитувањата се прават за да се открие дали пожолтувањето се должи на хепатоцелуларна оштета од акутна или хронична црнодробна болест.
- Да се дијагностицира хемолиза (в. хемолитична анемија).
- Вистинскиот иктерус треба да се диференцира од Gilbert-ов синдром и од хиперкаротинемија, што се наоѓа кај пациенти што јадат многу моркови.

### ДЕФИНИЦИЈА

- Жолтицата се детектира на склерите или на кожата или ако серумскиот билирубин е  $>40$ .

### ПАТОФИЗИОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИКТЕРИЧНИОТ СИНДРОМ

#### Хемолиза или Gilbert-ов синдром

- Билирубинот е **неконјугиран** (вкупен билирубин наголемен, конјугираниот е нормален). Концентрацијата на аминотрансферазите е нормална.

#### Паренхиматозен иктерус

- Покачен конјугиран билирубин.
- Акутна жолтица
  - Акутен вирусен хепатитис.
  - Медикаментозен хепатитис или хепатитис од хербални продукти.
  - Десна срцева слабост.
  - Постоперативно жолтило.
  - Сепса.
  - Интравенска исхрана.
- Хронична жолтица
  - Алкохолен хепатитис.
  - Црнодробна цироза.
  - Автоимун хепатитис.

- Хроничен вирусен хепатитис (ХБВ, ХЦВ).
- ХЦЦ - хепатоцелуларен карцином.
- Интракраничен холангиокарцином.
- Метастатски депозит во црниот дроб.

### **Опструктивен иктерус**

- Холедохолитијаза.
- Холециститис.
- Карцином на панкреасот.
- Холангиокарцином на екстракраничните жолчни патишта.
- Акутен или хроничен панкреатитис.
- Спазам на Одиев сфинктер.
- Постоперативна структура на билијарното стебло.

### **Иктерус од хиперкаротинемија**

- Нема жолтило на склерите.
- Црнодробните функционални тестови се нормални; обично анамнезата и физикалниот наод се доволни за да се постави дијагноза.

## **ИСТОРИЈА НА ПАЦИЕНТОТ**

- Времетраење на жолтицата.
- Јадеж (знак за опструктивен иктерус или интракранична холестаза).
- Болка во stomакот (честа при опструкција, но може да се јави и кај алкохолниот хепатитис).
- Холецистектомија.
- Намален апетит (вирусен хепатит).
- Слабеење (малигнитет).
- Патување во странство, контакт со иктеричен пациент, трансфузија.
- Лекови.
- Консумирање на алкохол; прашајте ги пријателите или фамилијата).

## **НАОДИ**

- Осетливост (холециститис).
- Наголемен црн дроб (алкохолна стеатоза, хепатитис, тумор).
- Конзистенција на црниот дроб.
- Знаци за портална хипертензија: спајдер невуси, палмарен еритем, гинекомастија, спленомегалија, асцитес.
- Палпабилно безболно жолчно ќесе (карцином на панкреас).
- Лузни од инјекции.

## **УЛТРАЗВУК НА АБДОМЕН**

- Пациент со акутен иктеричен синдром треба да се упати во болница до следниот ден. Ако опструктивниот иктерус трае повеќе од три недели, може да настане трајно оштетување на црниот дроб. Опструкцијата треба да се отстрани пред тоа.
- Ултразвучниот преглед може да диференцира опструктивен од паренхиматозен иктерус: кај опструктивниот иктерус интракраничните жолчни канали обично се дилатирани (може да бидат нормални во првите неколку дена). Може да се визуализираат жолчни камчиња, холециститис и црнодробни метастази.

## ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

- Крвна слика, CRP, билирубин вкупен, конјугиран билирубин, ALT, AST, алкална фосфатаза, GGT, амилази во serum и урина, албумини, протромбинско време или ИНР, HAV (хепатитис А вирус), IgM антитела, HBsAg , анти HCV антитела(хепатитис Ц вирус).
- За да се утврди хемолиза во serumот се одредуваат бројот на ретикулоцити, лактат дехидрогеназа (ЛДХ) и концентрацијата на хаптоглобин.
- Интерпретација
  - Покачена AP>150 U/L е наод сугестилен за опструктивен иктерус.
  - Покачен MCV<sup>1</sup>, зголемен GGT/AP однос, покачен AST/ALT сооднос сугерира алкохолна црнодробна болест.
  - Намален serumски албумин со продолжено протромбинско време сугерира паренхиматозна болест.
- Ако интрахепатичните билијарни канали не се дилатирани и не е јасна причината за жолтицата, по направените испитувања набројани погоре, одредете го serumскиот IgG, IgA и IgM, антинуклеарни антитела, анти-глаткомускулни антитела, антимитохондријални антитела, можно и други тестови што се однесуваат на вирусни хепатитиси (ЦМВ и ЕБВ антитела).

### Други испитувања

- МРИ<sup>2</sup> холангиографија е метод за скрининг на причината за опструкција пред ЕРЦП ако е веројатноста за холелитијаза мала или умерена.
- Ендоскопска ретроградна холангиографија ЕРЦП е најдоброто испитување во евалуација на локацијата и типот на опструкција на билијарното стебло. Ако е потребно, опструкцијата може да се реши со екстракција на калкулоза или стентирање на малигна стриктура.
- Доплер ултразвук (промени или опструкција на протокот во портната вена и хепатичните вени), КТ или МРИ се прават во специјални случаи (хемохроматоза, тумори).
- Биопсија на црниот дроб е најдобар начин за евалуација на етиологијата, тежината и прогнозата на хронична црнодробна болест (зголемена концентрација на црнодробните ензими >6 месеци).

## ПОВРЗАНИ ДОКАЗИ

- Пациенти кај кои се изведува ендоскопска ретроградна холангиографија (ЕРЦП) под седација со пропофол се седираат побргу, подобро ја толерираат процедурата и побргу заздравуваат во споредба со оние пациенти што примаат седација со мидазолам и меперидин. Изгледа дека нема разлика меѓу групите во однос на морталитетот, хипоксемијата, хипотензијата или стапката на завршување на процедурата (ннд-С).
- Тамохифен нема ефект на преживувањето кај пациенти со хепатоцелуларен карцином (ннд-А).
- Сфинктеротомијата може да е од корист кај пациент со дисфункција на Одиев-иот сфинктер кај кој е наголемен притисокот на сфинктерот (>40mmHg), но не кај пациенти со нормален базален притисок (ннд-В).
- Предоперативната билијарна дренажа нема поволен ефект врз морталитетот и компликациите кај пациенти со опструктивна жолтица кај кои е потребна хирургија. Во некои специфични места на лезијата таа може да предизвика повеќе компликации (ннд-С).

<sup>1</sup> MCV- среден корпускуларен волумен на еритроцити.

<sup>2</sup> МРИ-магнетна резонанца.

## **ДРУГИ РЕЗИМЕА НА ДОКАЗИ**

- Нема третмани што изгледа дека се ефективни за хепатоцелуларниот карцином. Тамоксифен, имунотерапија со интерферон и емболизација бараат понатамошни испитувања (ннд-**D**).
- ЕРЦП е еднакво важен во дијагнозата на холедохолитијаза или во малигни панкреатобилијарни опструкции како и МРЦП (магнетнорезонантна холангипанкреатографија) и ЕУС (ендоскопски ултразвук) (ннд-**C**).

## **ИЗВОРИ ОД ИНТЕРНЕТ**

- Cholangiocarcinoma. Orphanet ORPHA70567 **1**

## **РЕФЕРЕНЦИ**

1. Simonetti RG, Liberati A, Angiolini C, Pagliaro L. Treatment of hepatocellular carcinoma. Ann Oncol 1997;8:117-136.
2. The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-970453. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software
3. Craig AG, Tooili J. Sphincterectomy for biliary sphincter of Oddi dysfunction. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD001509. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently
4. Pekka Pikkarainen Article ID: ebm00212 (009.010) © 2005 Duodecim Medical Publications Ltd

**Последен пат прегледано за ажурирање на 17.05.2013 • Последна промена 21.2.2011**

**Article ID: ebm00996 (020.050)**

**© 2014 Duodecim Medical Publications Ltd**

1. **EBM Guidelines, 17.05.2013, [www.ebm-guidelines.com](http://www.ebm-guidelines.com)**
2. **Нема промени во упатството до 2014 година.**
3. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
4. **Предвидено е следно ажурирање во 2018 година.**

**Упатството го ажурираше Доц. Д-р. Марија Вавлукис**

**Координатор: Проф д-р Катица Зафировска**