



ЕДУКАЦИЈА ВО ЦЕРРАХПАША МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ИСТАНБУЛСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ, ИСТАНБУЛ ТУРЦИЈА

Kulak burun bogaz (ORL) Cerrahpasa anabilim dali CERRAH SERVISI

*Kocamustafa pasa cadesi No53,34098 Istanbul
Турција (05.10.2014 - 07.11.2014)*

*Специјалист по ОРЛ-Др. Гарип Хасипи
ЈЗУ општа болница Ферид Мурад -Гостивар*

Датум на презентација :12.11.2014



Едукација во универзитетска клиника “Сerrahpasa”- ОРЛ- оперативен сервис

- Сerrahpasa се наоѓа во Аксарај, околина на Фатих, има добра комуникација со околните населби на Истанбул.
- Во околината на болницата се наоѓа нај познатите места на Истанбул како капалицарши, Аја Софија, топкапи сарајот и Ахмет Паша џамија.
- Бевме многу добро пречекани како од страна на персоналот на болницата и именуваниот ментор за едукација доц.др- Мурат Јенер.



Оперативниот дел на клиниката

- Оперативниот сервис се состоеше од три оперативни сали, опремени со најсовремена софистицирана апаратура.
- Во трите оперативни сали опремени секој со електронски микроскоп, поврзани на големи екрани.
- Биполарен термокаутер, електронски индикатор за откривање на периферните нерви.
- Централна аспирација и централен O₂
- Заедничка просторија за пред оперативна припрема (перенје на раце)



Операции на клиниката на кои бев присутен

- Тонзилектомии- за нив специфичен пристап, со ендотрахеална анестезија, користење на биполарен термокаутер, машек не се користеше и шлинга не се користеше.
- Операции на уши: естетска операција на аурикула, радикална операција, мастоидектомија, мирингопластика, тимпанопаластика, и на 4 кохлеарни импланти.
- Оп. на нос- фес со одтранување на патолошки субстрат, риносептопластики по отворен пристап.
- Оп. на Ларингс- класични операции на тотална ларингектомија, парцијална ларингектомија со зачувување на гласот и говорот, трахеотомии, интервенции на ларингс со ласер при хиперкератози, полипи , папиломи и имплантација на гел при паретични гласилки и еднострани кордектомии, решавање на стенози на трахеа.



- Блок дисекции со сочуввање на n. accesorius
- тироидектомии 3 случаја со тотална тироидектомија со сочување на n. Laryngeus recurrens како и добра хемостаза.
- Паротидектомии: целосни при малигни тумори со сочување на n. Facialis каде се користеше индикатор за докажување на нервот.
- Имплантиранје на кохлеарен апарат- операцијата започнува со ретроаурикуларен рез во вид на благо свртена латински С буква, со задна тимпанотомија се пристигнува до округлиот отвор, се деструира кохлеата, и се имплантира електродите на апаратот.



Заклучоци/Научени лекции

Благодарам за укажаната
можност и доверба.