

ЕДУКАЦИЈА ОД ОБЛАСТ НА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА И КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

*ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ Скопје, Кабинет за Коронарен стрес
тест, Букурешт
Клиника за кардиологија, ЈАПОНСКА БОЛНИЦА - ТОКУДА, Софија,
Бугарија, во период од 18.01-05.02. 2016)*

Прим. Др. Биљана Филиповска Шимиќ

02.2016 год.


Во тек на едукативниот престој на Клиниката за Кардиологија во Болницата Токуда во Софија бев вклучена во неколку дијагностички постапки

-Изведување на Коронарен стрес тест(односно РЕП-Работна Електрокардиографска Проба)

-Ехокардиографија-стандардизирана-трансторакална ехокардиографија (ТТЕ), трансезофагеална ехокардиографија(ТЕЕ) како и стрес ехокардиографија

-Холтер дијагностика(24 часовен Холтер за мониторирање на крвен притисок како и 24 часовен Холтер за Електрокардиографска процена)

- И покрај тоа што не бев вклучена во работниот дел, имајв можност да го посетам и Одделот за инвазивна дијагностика-Салата за коронарографија
- Интервенциите се изведуваат во современо опремена сала како и со најсовремена апаратура
 - Пристапот е радијален а се користат во најголем процент DES-Drug eluting stents а поретко и биоразградливи стентови



КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Се изведува по модифициран Bruce протокол, на 2 минутни интервали на Kettler апарат

Индикациите за изведување ги поставува референтниот интернист –кардиолог според постоечка симптоматологија но и како контрола- следење по интервентни процедури-PTCA и стентирање или CABG

Кабинет за коронарен стрес тест



ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

Етаблирана дијагностичка постапка за
процена на

-структура и димензии на срцеви
кавитети

-одредување на функција и кинетика на
лева комора како и процена на
дијастолна дисфункција

-валвуларен апарат(вродени и стекнати
срцеви мани)

-состојба на перикард

Кабинет за Ехокардиографија





Сликовен приказ на ехокардиографски преглед(пропратен во склоп на извештајот)

СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

Се изведува по соодветен протокол а се користи Dobutamin даден интравенски во определена доза за определено време според телесната тежина на пациентот, кој го дава ефектот на физички замор

Индикација за изведување е пред се неможност на пациентот (возраст, проблем со локомоторен апарат) да го изведе стандардизираниот стрес тест на подвижна –тредмил лента или на ерговелосипед

Се следат вообичаените параметри -крвен притисок и срцева фреквенција во одредено време а ехокардиографски – работа на срцето на испровоцирано медикаментозно напрегање- кинетика на ѕид на лева комора и на септум(вентрикуларен и атријален), срцеви залистоци, и постоење на провоцирна ангинозна болка, стенокардија

И се разбира на Клиниката имаат и стручни-едукативни програми како што беше Курсот за Бифуркациони и Комплексни коронарни интервенции-Fifth Edition of Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course о 22-23.01.2016 под покровителство на Бугарското Кардиолошко Здружение и Бугарското Здружение за Интравентна Кардиологија со учество на истакнати светски имиња – Y.Louvard , R.Gill, I.Ungi,G.Rigatelli, G.Heyndrickx,V.Gelev

- Осврт на стентирање на коронарни бифуркации, нови интервенциски технологии, и нова генерација на DES и Bioresorbable stents
- Принципи на интраваскуларен оптичко-фреквентен имиџинг(OFDI)
- Употреба на Rotablator
- FFR-искуства и можности

BULGARIAN BIFURCATION and COMPLEX CORONARY INTERVENTIONS COURSE

22-23
January 2016
Sofia, Bulgaria



BulSIC+
Bulgarian Society of
Interventional Cardiology



with the association of
Bulgarian Society of Cardiology

Host
Medica Hospital Sofia
www.medica-hospital.org

ЗА КРАЈ

- ИСПОЛНЕТ ПРЕСТОЈ
- КОРЕКТЕН ПРИЕМ ОД КОЛЕГИТЕ
- МОЖНОСТ ЗА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА
- НАДОГРАДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ ЗНАЕЊА