



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прехоспитален третман на акутен миокарден инфаркт (АМИ)



ЈЗУ Здравствен дом Велес

***Универзитетска Клиника Церапаша - Истанбил Р.Турција од 10-28 октомври
2016г***

др.Лидија Проданова


Ноември 2016г





ДЕФИНИЦИЈА

Терминот миокарден инфаркт претставува состојба на ненадејна исхемична некроза од ненадаен прекин на коронарен проток во различн регии на миокардот.





КЛИНИЧКИ СИМПТОМИ

- ГРАДНА БОЛКА
- ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ
- БОЛКА ВО ЛЕВА РАКА И ГРБ
- БОЛКИ НА ДОЛНА ВИЛИЦА
- СЛАБОСТ
- ВРТОГЛАВИЦА И ПОТЕЊЕ

Градна болка



Болка на лева рака и грб



Болка на долна вилица



Отежнато дишење



Вртоглавица и потење




Слабост и стомачен дискомфорт





ДИЈАГНОЗА

- 12 КАНАЛНО ЕКГ не подолго од 10 мин од првиот контакт со пациентот и истиот да се постави на екг мониторинг
- Брзи тестови за одредување на маркери на миокардна некроза





ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

СРЦЕВИ	ПУЛМОНАЛНИ	ВАСКУЛАРНИ	ОРТОПЕДИЈА
Кардијална траума Миокардит перикардит	Пнеумонии Пнеумоторакс Пулмонална емболија Плеуритис	Церебро-васкуларни заболувања Аортна дисекција Аортна аневризма	Мускулни повреди Цервикална дископатија



Прехоспитален третман

- Поставена венска линија
- Даден интравенски опиоид- morphine (обезболување)
- Аплицирана маска со кислород 2-4 l во минута
- Таблета aspirin 300 mg
- Аплицирана нитроглицеринска пумпа
- Дадена фибринолитичка терапија со предходна консултација со кардиолог- 5000и. е хепарин
- Комуникација помеѓу тимот на ургентната амбуланта и болницата каде ќе се врши реперфузија на пациентот
- Транспорт на пациентката до кардиолошкиот центар со соодветен тим и апаратура.





Научени лекции

- Прием и преглед на пациент во интернистичка и траума ургетна амбуланта
- Хирушки амбулантски постапки
- Опсервација на интернистички пациенти
- Воспоставување на артериски пристап за гасни анализи
- Интравенозен пристап во вратна вена
- Декомпресија со игла при тензионен пневмоторакс
- Обезбедување на дишни патишта со ларингеална маска





Третман на рани со помош на лепило и
сутурирање на рани со
помош на Braun маниплер, со што ќе се намали
работата во хируршките амбуланти.





Заклучок

Благодарност до министерството за здравство што ми ја овозможи оваа едукацијата во У.К Церапаша -Истанбул.

Она што може да се примени во нашиот здравствен систем е секако начинот на комуникација кој се обавува преку мрежен систем во кој се опфатени сите три нивоа на здравствена заштита. Морам да нагласам дека задоволство ми беше што присуствував на неделни семинари. На кои што вработените од ургетниот оддел презентираа по еден случај од тековната недела под надзор на раководното лице.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.moh.gov.mk